

**Памятка**  
**для законных представителей о проведении вакцинации у подростков (от**  
**12 до 17 лет включительно) против COVID-19**  
**«Гам-КОВИД-Вак-М»**

Ваше крепкое здоровье-наша главная цель! Чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

1. Законный представитель несовершеннолетнего (родитель, опекун) пишет заявление на имя главного врача о согласии проведения вакцинации несовершеннолетнему.

2. Добровольное информированное согласие оформляется законным представителем (если возраст несовершеннолетнего до 15 лет) или самим несовершеннолетним в возрасте старше 15 лет.

3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача-педиатра (фельдшера) с измерением температуры, сбором эпид анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач (фельдшер) расскажет о возможных реакциях на вакцинацию.

4. Вакцинацию проводят в два этапа:

I компонент в дозе 0,5 мл вводят внутримышечно

II компонент вводят на 21 день в дозе 0,5 мл. внутримышечно.

5. В течении 30 минут после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

6. После проведения вакцинации (и I компонента и II компонента) в первые- вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течении трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечается тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Возможно развитие аллергических реакций.

7. Рекомендуются в течение 3-х дней не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства по возрасту. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства по возрасту.

8. Курс иммунизации считается завершенным после проведения двух этапов вакцинации.

9. Всю информацию о возможных реакциях на вакцинацию Вы можете получить у медицинского работника образовательного учреждения, которое посещает несовершеннолетний, или «Центра здорового ребенка» ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

**ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ПРИВИТОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМОСТЬ НОСИТЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ.**

